

Лактирующие коровы «Буффер» 19908

Задача буфера - восстановить рубцовую ферментацию и состав крови, обеспечивающий нормальный синтез молочного жира. На практике решить ее удастся за счет увеличения буферной емкости рубцового содержимого.

Результатом кормления Буферной смеси является повышение синтеза молочного жира в преджелудках, увеличение образования и секреции жирных кислот. Добавка способствует всасыванию жиров из тонкого отдела кишечника. Она активизирует молочную железу, направляя ее на усиление синтеза молочного жира и продукцию молока в целом. Кроме того, усиливается синтез стероидных гормонов, в значительной степени улучшается общее состояние животных и стимулируются их воспроизводительные функции.

Эта добавка рекомендуется в основном на летне-пастбищный период для предотвращения снижения содержания жира в молоке и на стойловый период для хозяйств, когда количество клетчатки (из силоса и сена) в рационах не достигает 3,3 кг/гол. /сут.

Показания к применению:

- наличие в рационе кислых, влажных кормов; общая влажность кормосмеси выше 50%
- высокий уровень концентратов в рационе (более 40% в сухом веществе)
- раздельная (не в составе кормосмеси) подача концентратов;
- несбалансированность концентратов (большое количество крахмала и протеина, перевариваемых в рубце)
- мелкая резка силоса, мелкий помол концентратов;
- недостаток грубых кормов и физически эффективной клетчатки в рационе;
- внешние признаки ацидоза у животных (заболевания конечностей, низкое содержание жира в молоке, высокий уровень расхода кормов на единицу продукции, проблемы воспроизводства стада);
- ацидоз в острой форме, атония рубца;
- первые 2-4 дня после отёла для сдвига величины кислотно-щелочного баланса крови в положительную сторону.

Дозировка и способ применения:

- Коровы дойные 50 - 150г/гол/сут. Подача в составе кормосмеси или дробная подача с первыми утренними порциями концентратов, по силосу, по кислому и/или влажному корму.
- Коровы новотельные-100-200г/гол/сут. в первые 2-4 дня после отёла. Подача в составе кормосмеси или дробно с каждой порцией концентратов и по силосу.
- Молодняк на выращивании и откорме, нетели до 7-ми месячной стельности 50/гол/сут. Подача в составе кормосмеси или дробно с каждой порцией концентратов и по силосу.
- Коровы сухостойные и нетели в период за 2 месяца до отёла до срока 3 недели до отёла применение не желательно. При острой необходимости (высокая кислотность корма, хронический ацидоз, недостаток грубых кормов) 100-200г/гол/сут. Подача в составе кормосмеси или дробно с каждой порцией концентратов и по силосу.