

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ

16.07.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Вермидин[®] таблетки

(Организация - разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-4.17-3677№ПВР-3-23.11/02787

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Вермидин[®] таблетки (Vermidin tabulettae).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: празиквантел, пирантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Вермидин[®] таблетки выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в одной таблетке:

Вермидин[®] таблетки для кошек (300 мг): празиквантел – 15 мг и пирантела памоат – 75 мг;

Вермидин[®] таблетки для собак (550 мг): празиквантел – 40 мг и пирантела памоат – 200 мг.

В качестве вспомогательных веществ Вермидин[®] таблетки содержат: лактозу, крахмал картофельный, кальция стеарат, натрия кроскармеллозу, гидроксипропилметилцеллюлозу (в составе Вермидин[®] таблетки для собак).

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки круглой, плоскоцилиндрической формы с фаской, риской и логотипом «ВВ», светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, допускаются вкрапления.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения, в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Лекарственный препарат Вермидин[®] таблетки запрещается применять по истечении срока годности.

4. Вермидин[®] таблетки выпускают расфасованными по 2 таблетки в блистере. Каждый блистер снабжают инструкцией по применению.

5. Хранить Вермидин[®] таблетки следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Вермидин[®] таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: антигельминтные средства в комбинациях.

10. Комбинация входящих в состав препарата празиквантела и пирантела памоата обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у кошек и собак, в том числе *Toxocara* spp., *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma* spp., *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель нематод и цестод, и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта. Соединение быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-3 часа, обратимо связывается с белками сыворотки крови (70-80 %), частично метаболизируется в печени, реэскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80 %) в течение 24 часов.

Пирантела памоат – соединение группы пиримидинов, механизм его действия основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод; пирантел плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями (93 %) в течение 24 – 48 часов.

Вермидин[®] таблетки по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывают сенсibiliзирующего, эмбриотоксического и тератогенного действий.

III. Порядок применения

11. Вермидин[®] таблетки назначают кошкам, котятam с 3-недельного возраста, собакам и щенкам с 2-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токскарриоз, унцинариоз, анкилостомоз) и цестодозах (эхинококкоз, альвеококкоз, мезоцестоз, дипилидиоз, тениоз, дифиллоботриоз) и смешанных нематодозно-цестодозных инвазиях.

12. Противопоказанием к применению Вермидин® таблеток является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат дегельминтизации истощенные, больные инфекционными болезнями животные:

котята до 3-недельного возраста или массой менее 0,5 кг.

щенки до 2-недельного возраста или массой менее 0,5 кг.

13. При применении лекарственного препарата Вермидин® таблетки следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата избегать прямого контакта с Вермидин® таблетками.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Вермидин® таблетки не следует применять самкам в первой половине беременности. Дегельминтизацию беременных и кормящих кошек при необходимости проводят по назначению ветеринарного врача за три недели до предполагаемых родов или через 2-3 недели после родов.

15. Вермидин® таблетки применяют с лечебной и профилактической целью индивидуально, однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма (в куске колбасы, мяса, с фаршем, кашей).

«Вермидин® таблетки для кошек» назначают:

- взрослым кошкам в дозе 1 таблетка на 3 кг массы животного;
- котятам с 3-недельного возраста или массой от 0,5 кг до 1,5 кг, в дозе – ½ таблетки.

«Вермидин® таблетки для собак» назначают:

- взрослым собакам в дозе 1 таблетка на 8,0 кг массы животного;
- щенкам с 2-недельного возраста или массой от 0,5 кг до 4,0 кг, в дозе – ½ таблетки.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

При высокой степени инвазии дегельминтизацию рекомендуется повторить через 10 дней.

С профилактической целью взрослых кошек и котят, начиная с 3-недельного возраста, дегельминтизируют 1 раз в 3 месяца; взрослых собак – ежеквартально, щенков (в зависимости от схемы вакцинации) – в 2-недельном возрасте, далее в 4-6 недель, 10-12 недель, 6 месяцев.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций использование Вермидин[®] таблеток прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. В этих случаях животному назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии.

18. Вермидин[®] таблетки не следует применять одновременно с пиперазином, левамизолом и средствами, ингибирующими холинэстеразу, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

19. Особенности действия при первом применении Вермидин[®] таблеток или при их отмене не установлено.

20. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Вермидин[®] таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3. тел/факс: (495) 785-83-50/70.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Вермидин[®] таблетки, согласованная Россельхознадзором 11 апреля 2017 года.