

Юнилак-16%

Качественный заменитель цельного молока для телят европейского уровня с 16-ти процентным содержанием жира, обогащенный витаминами и минералами.

Рекомендации по приготовлению:

Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 50-55°C. Всыпать порошок из расчета 140 г на 1 литр готовой смеси и хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси 38-40°C. Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

Состав

Протеин сырой, не менее	22,0 %
Жир сырой, не менее	16,0 %
Углеводы, не менее	47,5 %
Клетчатка сырая, не более	0,5 %
Зольный остаток, не более	9,0 %
Влага, не более	5,0 %
Макроэлементы, не менее	
Ca (кальций)	1,2 %
P (фосфор)	0,8 %
Na (натрий)	0,6 %
K (калий)	1,9 %
Cl (хлор)	1,8 %
Микроэлементы, не менее	
Fe (железо)	45 мг
Cu (медь)	20 мг
Mg (магний)	25 мг
Se (селен)	0,5 мг

Витамины, не менее

A (ретинол)	50 000 ME
D 3 (холекальциферол)	8000 ME
E (токоферол)	40 мг
K 3 (фитодианин)	3 мг
B 1 (тиамин)	5 мг
B 2 (рибофлавин)	10 мг
B 3 (пантотеновая к-та)	15 мг
B 5 (ниацин)	44 мг
B 6 (пиридоксин)	4 мг
B12 (цианкобаламин)	40 мг
C (аскорбиновая к-та)	100 мг
Аминокислоты, не менее	
Лизин	1,57 %
Метионин	0,37 %
Метионин + цистин	0,72 %
Треонин	1,03 %
Триптофан	0,30 %
Обменная энергия	- 17,47 МДж/кг

Схема выпойки телят

Возраст молодняка

1-2 день
3-6 день
7-8 день
9-10 день
3-4 неделя
5-8 неделя
9 неделя
Далее

Кратность выпойки молочных кормов

1,5 – 2 литра молозива 3-4 раза в день
2 литра молозива 3 раза в день
2 раза в день по 3 л (50% коровье молоко 50% Юнилак 16)
2 раза в день по 3 л (25% коровье молоко 75% Юнилак 16)
2 раза в день по 3 л Юнилак 16
2 раза в день по 2,5 л Юнилак 16
2 раза в день по 2, л Юнилак 16
2 раза в день по 1,5 л Юнилак 16