

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мастометрина® для профилактики и лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы самок животных
(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастометрин® (Mastometrin®).
Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Мастометрин® содержит матричные настойки растительного и органического происхождения (в 1000 мл): Juniperus sabina Ø - 30 мкл, Lachesis mutus D4 - 1 мкл, Pulsatilla pratensis Ø - 0,03 фл, Sepia gruneris Ø=D1 - 0,1 мкл; АСД фракция 2 - 10 пл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата тригидрат - 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

3. Выпускают Мастометрин® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

4. Мастометрин® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 21 день. Мастометрин® запрещается применять по истечении срока годности.

5. Мастометрин® следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мастометрин® относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Обладает противовоспалительным действием, повышает тонус и сократительную способность миометрия, восстанавливает структуру и функцию эндометрия, стимулирует тканевой иммунитет и повышает бактерицидные свойства цервикальной слизи.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Мастометрин® назначают самкам крупного рогатого скота, свиней, лошадей, пушных зверей, кошкам, собакам для лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы: острого, хронического и субклинического эндометрита, синдрома ММА, острого серозного и катарального мастита, а также профилактики послеродовых осложнений.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

10. Мастометрин® вводят внутримышечно или подкожно.

Сельскохозяйственным животным:

- для лечения хронического и субклинического эндометрита, синдрома ММА 3-4 инъекции с интервалом три дня;
- для лечения острого серозного и катарального мастита 1 раз в сутки, в течение 3-5 дней.

Собакам, кошкам и пушным зверям:

- для профилактики послеродовых осложнений – после родов 1-2 инъекции с интервалом 24-48 часов;
- при остром течении мастита и эндометрита 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней;
- при подостром и хроническом течении эндометрита 2-3 раза в неделю.

Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но не более 1 месяца.

Разовая доза препарата на одно животное составляет:

- крупному рогатому скоту, свиньям – 5,0 мл/животное;
- лошадям – 8,0-10,0 мл/животное;
- собакам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам, пушным зверям – 0,5-1,0 мл/животное.

11. Симптомы передозировки у животных не установлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

14. При применении Мастометрина® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Применение Мастометрина® не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Продукция животного происхождения во время и после применения Мастометрина® может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мастометрином® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Мастометрина® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Адрес места производства: 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Инструкция разработана ООО «АлексАнн» (141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения:

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мастометрина, утвержденная Россельхознадзором 08 октября 2012 г.