

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Стоп-цистита® для лечения и
профилактики заболеваний мочевыводящих путей
и мочекаменной болезни у кошек и собак

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп - цистит® (Stop-cystitis).

Международное непатентованное наименование: нитроксалин, дроптаверин, горца птичьего экстракт, крапивы листьев экстракт, плоды можжевельника, брусники листьев экстракт, солодки корней экстракт.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Стоп-цистит® выпускают в двух модификациях: «для собак» и «для кошек», которые в качестве действующих веществ в 1 мл содержат, соответственно: нитроксалин – 12,5 мг и 6 мг, дроптаверина гидрохлорид – 15 мг и 5 мг, экстракты лекарственных растений: травы горца птичьего – 5 мг, листьев крапивы - 5 мг, плодов можжевельника - 5 мг, листьев брусники - 5 мг, корней солодки - 5 мг, а также вспомогательные вещества: апасвит Ц-200 - 5 мг, Na-карбоксиметицеллюлоза – 1,5 мг, твин-80 – 6 мг, глицерин – 300 мг и вода очищенная до 1 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

3. Выпускают Стоп - цистит® расфасованным по 30 и 50 мл в полиэтиленовых флаконах соответствующей вместимости с навинчиваемыми крышками. Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку в комплекте с инструкцией по применению и шприцем-дозатором.

4. Хранят Стоп-цистит® в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применение Стоп-цистита® по истечении срока годности.

5. Стоп - цистит® следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Стоп-цистит® относится к комбинированным противомикробным и противовоспалительным препаратам.

Стоп-цистит® обладает выраженным противомикробным, противовоспалительным, антисептическим, спазмолитическим, диуретическим и салуретическим действием.

Нитроксолин, входящий в состав лекарственного препарата, является производным 8-оксихинолина, активен в отношении широкого спектра грамположительных, грамотрицательных бактерий и некоторых грибов, вызывающих инфекции мочевых путей, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Ureaplasma urealyticum*, *Corynebacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*

Дротаверин оказывает продолжительное спазмолитическое, миотропное и сосудорасширяющее действие, устраняет спазмы гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и тенезмы мочевого пузыря.

Комплекс биологически активных компонентов лекарственных растений (флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества, витамины, минеральные соединения) обладает антисептическими, мочегонными спазмолитическими и противовоспалительными свойствами, способствует выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

Стоп-цистит® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Стоп-цистит® назначают собакам и кошкам для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уретрит) и мочекаменной болезни, профилактики инфекций при диагностических процедурах и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

9. Противопоказанием к применению является острая сердечная и печеночная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Беременным и лактирующим животным препарат следует применять после консультации с лечащим ветеринарным врачом.

10. Стоп-цистит® применяют животным индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора с лечебной целью два раза в сутки, с профилактической один раз в сутки в течение 5-7 дней, в следующих дозах:

Вид и масса животного		Доза, мл/животное	
		суточная	разовая
кошки	до 5 кг	4,0	2,0
	от 5 кг	6,0	3,0
собаки	до 10 кг	4,0	2,0
	от 11 до 20 кг	6,0	2,0-3,0
	от 21 до 30 кг	8,0	3,0-4,0
	от 31 до 40 кг	12,0	4,0-6,0
	свыше 40 кг	16,0	6,0-8,0

Перед применением флакон тщательно встряхнуть.

Продолжительность курса применения лекарственного препарата определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. При первом применении лекарственного препарата у животного может наблюдаться обильное слюнотечение.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций использование Стоп - цистита® следует прекратить.

15. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами и кормами отсутствует.

16. Стоп-цистит® не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе со Стоп - циститом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп - циститом®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН»; 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп – цистита, утвержденная Россельхознадзором 2 июля 2009 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: