

Иванова Вероника Васильевна
МБОУ «Антоновская СОШ им.
Н.Н. Чусовского»
Антоновка/ Нюрбинский район
Зимующие птицы Якутии

*Зимующие птицы Якутии



В Якутии 291 видов птиц. Из них гнездящихся видов 250, вероятно гнездящихся 3 и залетных 38. На территории Якутии зимуют 48 видов птиц, 200 видов совершают массовые сезонные миграции. В Красные книги внесены 63 вида птиц Якутии



Белая куропатка - Хабды

Обитатель всей территории Якутии. Окраска зимой белая с черным хвостом, летом рыже-бурая с поперечным рисунком, крылья и брюхо белые. Самец и самка сходны по оперению. Масса самца 568 - 736 г. Зимой птицы держатся парами, стайками. Зимой основу рациона составляют почки, сережки и части побегов тальника. Места обитания - окраины болот, гари, , вырубки, ивняки, долины речек. В холодные дни ночуют под снегом. В гнезде 7-11 бледно-желтых с красно-бурыми пятнами яиц.



Глухарь - Чакыр улар

Обитатель юго-западной Якутии. Малочисленный вид. Масса самца 2850 - 6500 Гнездящаяся оседлая птица. Населяет леса различных типов с примесью сосны. Свойственны местные сезонные кочевки. Зимой нередко образуют отдельные стаи самцов и самок, питаются хвоей сосны. В бесснежный период года основу питания составляют ягоды, семена, цветки, побеги трав, беспозвоночные. В кладке 5-9 охристых с красно-коричневыми пятнами яиц.



Тетерев - Куртуйах

Распространен в Центральной Якутии. Обычный вид. Хвост в виде лиры. Масса самцов 1100 - 1600 г. Гнездящаяся оседлая стайная птица. Глухой тайги избегает. Предпочитает опушечные участки смешанных и березовых лесов. Береза почти единственный источник питания зимой (почки, сережки). Летом - ягоды, насекомые, соцветия трав. Наблюдаются сезонные кочевки. Кладка из 6-11 желтоватых с пятнами яиц.



Рябчик-Бочугурас

Обитатель всей таежной зоны. Обычный вид. Масса 327 - 580 г. Оседлая птица. Предпочитает смешанные и еловые леса. Держатся по одному, парами, редко стаями в 20-30 особей. Летом питаются беспозвоночными, семенами трав, кустарников, ягодами. Зимой сережками и почками берез, ольхи. В кладке 8-10 желтовато-белых яиц



Ворон - Суор

Распространен по всей Якутии. Птица крупных размеров, большим клювом. Масса самца 1100 - 1560 г. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет места, где открытые пространства чередуются с лесными насаждениями. Зимой чаще встречается в антропогенных ландшафтах. Держатся по одному или парами. Многоядный вид. В зависимости от сезона основу питания составляют мясо погибших животных, отбросы, мыши, насекомые, зерновые. В кладке 3-6 зеленовато-голубых с бурыми пятнами яиц.



Филин - Модьугу

Самая крупная из наших сов. Обитатель таежной зоны. Близости человеческого жилья избегает. Малочисленный вид. Масса самца 1800-2700. Питается разнообразными млекопитающими и птицами. Зимой основа питания заяц-беяк и мышевидные. Характерны сезонные кочевки, связанные с концентрацией кормов. Яйца белые, в гнезде 2-4. Внесен в Красную книгу РФ.



Пестрый дятел - Бэс тонсоҕойо

Обитатель южной половины Якутии. У самца затылок красный, у самки на голове красные перья отсутствуют. Масса самца 80-102 г. Гнездящаяся оседлая птица. Населяет высокоствольные леса. Предпочитает сосновые, еловые и смешанные леса. Зимой имеет постоянные участки обитания в сосновых лесах. Ночует в дуплах. Основа питания: беспозвоночные, муравьи, тли, усачи, чешуекрылые; зимой - семена сосны. Кладка из 4-8 белых яиц



Желна - Киргил

Обитатель таежной зоны. Малочисленный вид. Масса самца 315-387 г. Населяет высокоствольные леса и гари. Зимой имеет постоянный участок обитания. Ночует в дуплах. Совершает осенние кочевки. Основу питания составляют муравьи, короеды, усачи. Зимой питаются древоточцами. Откладывают 3-6 белых яиц.



Снегирь обыкновенный - Ымыы

У самцов низ тела красный, у самок - серый. Масса самца 25-36 г. Обитает в Центральной и Южной Якутии. Малочисленный вид. Гнездящаяся оседлая птица. Сезонные кочевки выражены. Держатся стайками, парами. Предпочитает еловые и смешанные леса, зимой-опушечные участки с зарослями кустарников. Основы рационы составляют плоды, семена трав, березы, почки лиственницы. В гнезде 4-6 светло-голубых с темными крапинками яиц.



Поползень обыкновенный - Кэкэ-бука

Населяет таежную зону Якутии. Малочисленный вид. Масса самца 83-91 г. Населяет высокоствольные леса. Сезонные кочевки выражены. Держатся по одному, редко по 2-3 особи вместе. Зимой ночуют в дуплах. Основу питания в течение года составляют беспозвоночные, обитающие на деревьях, Зимой поедает семена деревьев, при случае - мясо. Свойственно запасание кормов. Кладка состоит из 6-8 белых с красно-бурыми пятнами яиц.



Чечетка пепельная- Хаар чооруоа

Населяет лесотундру и тундру, обычный вид. Масса самца 12-17 г. Населяет разнообразные ландшафты с древесной и кустарниковой растительностью. Сезонные кочевки выражены. Держатся стаями. Основа питания: беспозвоночные, зимнего - семена трав и кустарниковых берез. 4-6 голубоватых яиц.



*

Большая синица - Улахан чычып-чаап

Населяет южную часть Якутии. Малочисленный вид. Масса - 18-21 г. Населяет разнообразные ландшафты, предпочитают лиственничные и смешанные леса. Зимой часто отмечается в черте населенных пунктов. Сезонные кочевки выражены. Держатся по одному, парами, группами. Основу рациона составляют беспозвоночные. Зимой поедают семена деревьев, при случае - мясо. 6-12 яиц белых с красновато-коричневыми пятнами.



*

Воробей домовоу - дьиз барабыайа

Населяет большинство населенных пунктов таежной части Якутии. Масса самца 30-41 г. В последние десятилетия значительно расширил ареал на север. Сезонные кочевки выражены. Держатся стаями. Зимой основу питания составляют пищевые отбросы, семена злаков, летом - насекомые, семена трав. Имеет 2 кладки (май, июнь). Кладка из 4-8 сероватых с буроватыми пятнами яиц.



Клест обыкновенный - Харыйа ымыыта

Населяет южную часть Якутии. Обычный вид. Масса самцов 30-47 г, населяет еловые и смешанные хвойные леса. В зависимости от урожая ели совершает не ежегодные массовые кочевки. Держатся стаями. Основу питания составляют семена ели. Может употреблять семена лиственницы. Поедает и насекомых. Кладка из 3-5 бледно-зеленоватых с темными крапинками яиц.